

OSCILAÇÕES CLIMÁTICAS PARA LAGOA SECA (PB)

CLIMATE OSCILLATIONS FOR LAGOA SECA (PB)

RAIMUNDO MAINAR DE MEDEIROS

Pós-Doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE

mainarmedeiros@gmail.com

Resumo: Objetiva-se analisar as oscilações climáticas temporais de precipitação e temperatura entre 1981-2019 para a cidade de Lagoa Seca buscando possíveis avarias destas oscilações nas atividades socioeconômicas, auxiliando os tomadores de decisão a respeito dos riscos possíveis. Os dados climáticos de precipitação foram adquiridos da Agência executiva d'água e clima do Estado da Paraíba referentes a 1981 a 2019 e os dados térmicos foi estimado pelo software Estima_T referente ao mesmo período de estudo. Estudos com tendências climáticas tornam-se mais compreensível quando se analisar séries temporais longas as quais possam ser divididas em subperíodos de 30 anos ao menos. As anomalias pluviais entre 2000-2019 registraram dez anos seco; seis anos muito seco; três anos muito chuvoso e um ano chuvoso, estas irregularidades pluviais nos leva a concluir que eventos climáticos e as ações antrópicas podem estar contribuindo para os registros destes cenários em escala local, a predominância de anos seco e muito seco vem ocasionando impactos aos produtores do hortifrutigranjeiro que vem utilizando-se de maiores tempos em irrigações.

Palavras-Chave: Índices pluviais e térmicos; variabilidades e mudanças climáticas; irregularidades pluviais.

Abstract: The objective is to analyze the temporal climatic fluctuations of precipitation and temperature between 1981-2019 for the city of Lagoa Seca, looking for possible damages of these fluctuations in socioeconomic activities, helping decision makers regarding possible risks. The climatic precipitation data were acquired from the Executive Agency of Water and Climate of the State of Paraíba for 1981 to 2019 and the thermal data was estimated by the Estima_T software for the same period of study. Studies with climate trends become more understandable when analyzing long time series which can be divided into sub-periods of at least 30 years. Rainfall anomalies between 2000-2019 recorded ten dry years; six years too dry; three very rainy years and one rainy year, these rainfall irregularities lead us to conclude that climatic events and anthropogenic actions may be contributing to the records of these scenarios at a local scale, the predominance of dry and very dry years has impacted produce and produce which has been using longer times in irrigation.

Keywords: Rain and thermal indices; variability and climate change; rain irregularities.

Introdução

Nas últimas duas décadas as comunidades científicas e acadêmicas vêm debatendo sobre as mudanças climáticas (IPCC, 2014; ANDRADE *et al.*, 2014; NUNES, 2016; WANDERLEY *et al.*, 2018). As alterações nos cenários para as mudanças climáticas que vem acontecendo, registrou acréscimo de 2° C na temperatura global do planeta, envolvendo nos seus desequilíbrios para os ecossistemas, como movimentos expressivos como queimadas, seca, chuvas torrenciais, excesso de umidade e aumento de temperatura na Floresta

Amazônica afetando toda sua biodiversidade, acarretado perdas expressivas de geleiras nas cordilheiras dos Andes e Himalaia, segundo o estudo do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2014).

A parte sul do município de Lagoa Seca encontra-se inserida nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, região do Baixo Paraíba, sendo o principal curso da água o riacho Marinho. Nas partes norte e leste encontram-se inserida na bacia do Rio Mamanguape, cujo principal curso d'água é o próprio rio. Todos os cursos d'água têm regime de fluxo intermitente e o padrão da drenagem é do tipo dendrítico. Tendo como principal atividade socioeconômica, a agropecuária sendo o carro chefe as atividades hortifrutigranjeiras, que são diretamente impactados pelas relações hidro meteorológicas predominantes.

Penereiro *et al.* (2013) revelara que os diagnósticos espaciais de tendências climáticas consentem a observação das oscilações no comportamento das suas alterações, fornecendo esclarecimento de subsídios de uma variável em uma região que vem permitindo mudanças significativas ao longo do tempo. Estudar as alterações climáticas ocorridas no passado permite uma melhor compreensão das variabilidades induzidas no presente, além de subsidiar elementos para investigação do comportamento do clima futuro.

Medeiros *et al.* (2018) estudaram as variabilidades pluviiais para São Bento do Uma (PE), forte centro avícola, em razão ao aumento da demanda hídrica necessária ao pleno desenvolvimento de suas atividades. O estudo pode ser utilizado como ferramenta para planejamentos e ações que visem gerenciar os recursos hídricos utilizando sistemas de captação d'água, armazenamento e represamento, evitando a problemática da escassez de água. Ressaltaram ainda, que existe a necessidade de políticas e planos de captação e aproveitamento das águas das chuvas, além do uso eficiente dos demais recursos naturais da região, para que o desenvolvimento socioeconômico não seja limitado pela baixa disponibilidade hídrica.

Medeiros *et al.* (2017) estudaram das alterações pluviiais mensais e verificaram sua possível tendência linear, identificando-se as maiores variabilidades na precipitação de Serra Talhada (PE) registram-se entre janeiro a abril, registrando altos índices pluviiais, seus índices com menores valores entre julho a outubro. Contudo, os autores afirmaram que a pluviosidade

local é bastante irregular no espaço, tempo e quantidade, sua distribuição e duração acontecem de forma diferenciada.

Priori (2014) mostrou que em áreas de ecossistemas frágeis e vulneráveis, como a região semiárida brasileira, onde as mudanças climáticas podem ocasionar marés altas ou tempestades severas em curto intervalo de tempo irá dificultar a drenagem das águas para o mar e causar o prolongamento de cheias, enchentes e/ou inundações causando problemas de saúde e socioeconômicos à população local. Silva *et al.* (2008) advertiram que danos econômicos a agropecuária com perdas parciais ou totais poderá acontecer, afetando o comprometendo e os abastecimentos d'água para a população ocasionado pelas altas irregularidades pluviais, com predominância de chuvas intensas e de curta duração, causando forte impacto social aos habitantes da região.

OPAS (2014) esclareceu que a velocidade e a magnitude nas mudanças poderão causar à extinção de muitas espécies (fauna e flora), acarretando em alterações ambientais que levará ao agravamento dos desastres como aumento do impacto socioeconômico e cultural, o crescimento populacional, urbanização, industrialização, o consumo de recursos naturais e da demanda sobre os ciclos biogeoquímicos. Onde o acréscimo das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, que são intensificados pelas atividades humanas (GHINI *et al.*, 2008), causado pela soma das ações produzidas pelas concentrações de gases de efeito estufa (SANTOS, 2006).

Santos Neto *et al.* (2014) asseguraram que entender o comportamento da tendência sazonal dos índices pluviométricos servem como opção para resolver múltiplos problemas de planejamentos urbano e rural, recursos hídricos, agropecuários, industriais e hortifrutigranjeiros, serviços de alertas a catástrofes e condicionar o cotidiano das atividades humanas locais.

Medeiros *et al.* (2016) analisando o comportamento das tendências térmicas e pluviais nas condições climatológicas em Bom Jesus - PI, salientaram que o cenário futuro é pessimista, sugerindo uma redução de até 20% na precipitação e 4° C de aumento na temperatura.

Estudos que mostraram possíveis tendências temporais de temperatura (MEDEIROS *et al.*, 2018), precipitação (GROPPO *et al.*, 2008; AMAZON *et al.*, 2012; KARMESHU,

2012; WANDERLEY *et al.*, 2018; YANG *et al.* (2010); CHIERICE *et al.* (2014); ISHIHARA *et al.* (2014); NÓBREGA *et al.* (2015); LAI *et al.* (2016); ZHIJIA *et al.* (2016). Para Farias *et al.* (2012) e Duarte *et al.* (2015) os quais trabalharam com eventos extremos de precipitação a partir da técnica dos Quantis para o Estado Pernambucano visando relacioná-los aos desastres decorrentes das tendências temporais

Objetiva-se analisar as oscilações das tendências climáticas temporais de precipitação e temperatura entre 1981-2019 para a cidade de Lagoa Seca (PB) buscando identificar os impactos nas atividades socioeconômicas, proporcionando subsídios aos tomadores de decisão necessários ao desenvolvimento municipal.

Material e Métodos

Lagoa Seca localiza-se na latitude de 07°10'15''S; longitude de 35°51'13''W e 634 metros de altitude posicionam-se na Microrregião de Lagoa Seca e Mesorregião do Agreste Paraibano. Limita-se com: Campina Grande, Massaranduba, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Montadas, Puxinanã e Esperança (Figura 1).



Figura 1. Posicionamento da cidade de Lagoa Seca dentro do estado da Paraíba. Fonte: Medeiros (2020).

Segundo Köppen (1928; 1931) o clima é do tipo “As” (quente e úmido Tropical chuvoso). Estudos como o de Alvares *et al.* (2014) confirma o tipo de clima estudado. A classificação climática de Thornthwaite (1948) e Thornthwaite *et al.* (1955) é do tipo (C₁ADa’) seco subúmido, megatérmico, com pequena ou nenhum excesso d’água e evapotranspiração com 29,66% da evapotranspiração potencial anual concentrada no trimestre mais quente do ano (novembro, dezembro e janeiro).

O regime pluvial insere-se na faixa das isoietas (linha que une o mesmo valor de precipitação) de 1.100 mm.ano¹ a 1.200 mm.ano¹ (MEDEIROS, 2016). As chuvas têm início por volta da segunda quinzena de março, aumentando de volume nos primeiros dias de abril e se prolonga até agosto, sendo o trimestre mais chuvoso os meses de maio a julho. No município estudado especificamente, as chuvas são fundamentais para o bom desenvolvimento do regime dos rios perenes, córregos, riachos, níveis dos lagos e lagoas, bem como para a ocupação do solo, sendo imprescindível ao planejamento de qualquer atividade o conhecimento da sua dinâmica. Normalmente as chuvas têm intensidade moderada seguidas de irregularidade devidas às falhas dos sistemas meteorológicos atuantes. Salienta-se que a ocorrência de períodos de veranicos (ocorrências de vários dias consecutivos sem chuva dentro do período chuvoso) no quadrimestre chuvoso (abril a julho) é possível e variante de ano para ano. Sua magnitude é variada dependendo da época e dos fatores meteorológicos. Tem-se registrado ocorrências com períodos de veranicos superiores a 17 dias mensais no intervalo de tempo decorrido dentro do quadrimestre (MEDEIROS, 2016).

Pretende-se analisar as variabilidades pluviais e térmicas e suas variabilidades utilizando-se dos dados pluviais foram fornecidos pela Agência executiva d’água e clima do Estado da Paraíba (AESAs, 2020), entre 1981 a 2019. Os dados da temperatura são referentes ao mesmo período dos dados pluviais. Utilizou-se do Software estima t_ para estimar os dados da temperatura levando em consideração as coordenadas geográficas do local e utilizando-se da equação seguinte.

$$T = C_0 + C_1\lambda + C_2\lambda^2 + C_3h + C_4\lambda^2 + C_5\lambda^2 + C_6h^2 + C_7\lambda\lambda + C_8\lambda h + C_9\lambda h$$

Em que:

C₀, C₁,..., C₉ constantes;

λ, λ², λ λ, λ h longitude;

$\emptyset, \emptyset^2, \lambda \emptyset$ latitude; $h, h^2, \lambda h,$
 $\emptyset h$ altura.

Os dados trabalhados têm 38 anos de observações contínuas e segundo o World Meteorological Organization (WMO, 2019) o clima de dada área ou região é caracterizado por um período mínimo de 30 anos com observações contínuas, pois quanto maior o período dos dados, maior será a credibilidade da distinção climática da área estudada. Estas apresentam séries históricas longas suficientes para serem classificadas quanto à variabilidade climática, e são distribuídas uniformemente.

Os dados foram preparados em planilhas eletrônicas pelo *Microsoft Office Excel* 2016, gerando-se gráficos, tabelas e realizou suas análises para a precipitação, temperatura média e ocorrência de tendência por utilização dos parâmetros citados.

Os dados de precipitação foram totalizados anualmente e, em seguida, foram calculados os quantis similarmente aos utilizados por Pinkayan (1966), Xavier e Xavier (1987) e Xavier (2002) referentes às probabilidades ($Q_{0,15}$), ($Q_{0,35}$), ($Q_{0,65}$) e ($Q_{0,85}$), de forma que, para cada ano, considerou-se os dados pluviométricos (Tabela 1), na Tabela 2 tem-se os cálculos dos quantis mensais e suas referentes probabilidades para os quantis como demonstrados acima.

Tabela 1. Classificação, probabilidade e intervalo médio de precipitação anual (mm) dos regimes pluviométricos de 1981 a 2019 para Lagoa Seca - Paraíba.

Classificação	Probabilidade	Intervalo médio de precipitação (mm)	
		Mínimo	máximo
Muito seco	$P < Q_{(0,15)}$	-	922,90
Seco	$Q_{(0,15)} \leq P < Q_{(0,35)}$	922,90	1083,25
Normal	$Q_{(0,35)} \leq P < Q_{(0,65)}$	1083,25	1210,79
Chuvoso	$Q_{(0,65)} \leq P < Q_{(0,85)}$	1210,79	1294,79
Muito chuvoso	$P > Q_{(0,85)}$	1294,79	-

Fonte: Xavier e Xavier (1987).

Tabela 2. Classificação, probabilidade e intervalo médio de precipitação mensal (mm) dos regimes pluviais de 1981 a 2019 para Lagoa Seca - Paraíba.

Classificação	Probabilidade	Intervalo médio de precipitação (mm)	
		Mínimo	Máximo
Muito seco	$P < Q(0,15)$	< 306,9	307,0
Seco	$Q(0,15) \leq P < Q(0,35)$	307,1	361,1
Normal	$Q(0,35) \leq P < Q(0,65)$	361,2	403,6
Chuvoso	$Q(0,65) \leq P < Q(0,85)$	403,7	431,6
Muito chuvoso	$P > Q(0,85)$	431,7	<431,8

Fonte: Adaptada por Medeiros (2020).

Resultados e Discussão

Na Tabela 3 têm-se as flutuações pluviais anuais, suas classificações conforme os intervalos dos quantis para cada ano, os anos classificados como “seco” foram: 1980; 1991; 1995; 1997 a 1999; 2001-2003; 2005; 2008; 2010; 2013; 2014; 2018 e 2019.

Os anos classificados como “muito seco” foram 1981; 1982; 1993; 2006; 2007; 2012; 2015 e 2017. Os anos classificados como “normal pluviométrico” foram: 1983; 1984; 1990 e 1996. Os anos de 1987; 1988 e 2009 comportaram-se como ano “chuvoso”. Registrou-se categoria “muito chuvosa” para os anos: 1985; 1986; 1992; 1994; 2000; 2004 e 2011.

Moura (2016) explicou que a ampliação urbana desordenada pode ser considerada como uma das causas do agravamento desta situação para as grandes e média cidades, como a ampliação dos desastres naturais (estiagens prolongadas, inundações, cheias, alagamento, enchentes, erosão, entre outros fenômenos). Segundo ainda o autor as ações voltadas à sustentabilidade, podem ajudar com melhorias necessárias nos âmbitos socioeconômico e ambiental e nas cidades afetadas para a estabilização do clima. A ampliação urbana e mais dimensionada vem causando prejuízos as comunidades e aos poderes públicos o que vem a corroborar com as discussões aqui apresentadas.

Tabela 3. Anos, total anual pluvial, classificação conforme os intervalos dos quantis para Lagoa Seca – PB entre 1981-2019.

Ano	Total Anual	Classificação	Ano	Total Anual	Classificação
1981	856,0	Muito seco	2001	1042,5	Seco
1982	867,0	Muito seco	2002	1010,8	Seco
1983	1091,1	Normal	2003	998,7	Seco
1984	1182,2	Normal	2004	1697,7	Muito chuvoso
1985	1657,0	Muito chuvoso	2005	971,5	Seco
1986	1522,4	Muito chuvoso	2006	783,1	Muito seco
1987	1236,7	Chuvoso	2007	844,2	Muito seco
1988	1251,5	Chuvoso	2008	1078,7	Seco
1989	928,5	Seco	2009	1256,4	Chuvoso
1990	1088,8	Normal	2010	971,4	Seco
1991	1078,0	Seco	2011	1797,1	Muito chuvoso
1992	1433,4	Muito chuvoso	2012	748,4	Muito seco
1993	607,5	Muito seco	2013	994,5	Seco
1994	1667,5	Muito chuvoso	2014	1010,6	Seco
1995	955,4	Seco	2015	807,1	Muito seco
1996	1202,0	Normal	2016	809,3	Muito seco
1997	961,1	Seco	2017	856,4	Muito seco
1998	586,0	Seco	2018	938,7	Seco
1999	817,7	Seco	2019	1077,0	Seco
2000	1584,4	Muito chuvoso			

Fonte: Medeiros (2020).

Destacam-se os anos com as classificações mensais de acordo com os intervalos dos quantis (Tabela 2) para o município de Lagoa Seca - PB no período de 1981-2019. Levando em considerações os intervalos de classes quantílicos foram determinados quatro (4) tipos de classificações. A classificação “muito seca” (MS) predominou na maioria dos meses. No mês de junho de 1994 e janeiro de 2004 registrou chuvas entre as normalidades (N), os meses de maio e julho de 2011 foram classificados como “muito chuvoso” (MC) e o mês de julho de 2015 classificou-se como “seco (S). Tais variabilidades foram decorrentes dos sistemas atmosféricos atuantes, não foram necessárias para ocasionar chuvas acima da média

quantilicas. Estudos como o de Marengo *et al.* (2008) e Marengo *et al.* (2015) vem a contribuir com os resultados discutidos neste artigo.

A climatologia dos eventos extremos dos valores máximos pluviiais mensais mostra que as maiores frequências absolutas dos Quantis de chuva forte, estão concentradas entre os meses de março a setembro. Nos meses de outubro a dezembro apresentaram menor registro de chuvas mensais, muito fortes ($15 < X < 35$ mm).

Monteiro *et al.* (2012) com dados correspondente à série histórica no período de 1980 a 2009 da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, na região do baixo curso do Rio Apodi-Mossoró, utilizando a técnica dos Quantis, por meio da metodologia proposta por Pinkayan (1966), Xavier (2002) e Xavier e Xavier (2007), o valor aproximado mensal de chuvas foi de 642,8 mm, sendo que os intervalos estabelecidos para cada classe extrema indicaram valores abaixo de 299,2 mm, o que corroboram com a metodologia que apresentou resultados concretos .

Wanderley *et al.* (2018) observaram maiores volumes diários de precipitação registrados entre 1961 e 2016 em Recife, todavia, esses dados foram diferentes ao concretizado nesse estudo, o período das chuvas para o município em estudo sofreu redução ocasionado pelo início do período seco.

Na Figura 2 observam-se a oscilação pluvial anual, média climatológica do período 1981- 2019 e seus valores quantis $Q_{(0,15)}$, $Q_{(0,35)}$, $Q_{(0,65)}$ e $Q_{(0,85)}$, para a cidade de Lagoa Seca - PB. As classificações dos anos pluviais foram realizadas de acordo com a Tabela 1, levando em considerações as classificações e as probabilidades para os intervalos médios da precipitação em relação aos quantis.

Para o $Q_{(0,15)}$ tem-se dois anos com valores anuais abaixo (1983, 1998), para o $Q_{(0,35)}$ apresentam os anos abaixo destes 1981, 1982, 1990, 1991, 1999, 2006, 2007, 2015 a 2017. No $Q_{(0,65)}$ registrou-se os anos de 1983, 1984, 1991, 1991, 1996, 2001 a 2003, 2005, 2008, 2010. Com índices pluviiais superiores aos $Q_{(0,85)}$ foram os anos de 1985, 1986, 1994, 2000, 2004 e 2011. Os anos que ficaram abaixo do $Q_{(0,85)}$ foram secos conforme a distribuições quantilicas apresentadas por Xavier e Xavier (1987).




Figura 2. Distribuição pluvial anual e seus valores quantis $Q_{(0,15)}$, $Q_{(0,35)}$, $Q_{(0,65)}$ e $Q_{(0,85)}$, para o município de Lagoa Seca - PB. Fonte: Medeiros (2020).

A curvatura polinomial (Figura 3) da precipitação demonstra os anos secos e chuvosos bem definidos além de mostrar que nos recentes anos compreendido entre 2010-2018 a redução dos índices pluviais está mais específica vista as irregularidades registradas, excetos os anos de 2011 e 2014. A curva de tendência polinomial apresenta-se com um coeficiente angular negativo e R^2 de baixa significância onde não se pode afirmar que está ocorrendo aumento ou redução nos índices pluviais.




Figura 3 - Precipitação anual (mm) e sua reta de tendência polinomial, para o período de 1981-2019 no município de Lagoa Seca - PB. Fonte: Medeiros (2020).

Marengo *et al.* (2011) afirmaram que a zona de convergência intertropical (ZCIT) é o importante sistema atmosférico causador de chuvas na região nordeste do Brasil, que é representado pelo eixo do cavado equatorial e suas diferentes variações em posição e intensidade que estão correlacionadas às altas subtropicais do Atlântico Norte e Sul.

Na Figura 4 têm-se as distribuições da precipitação mensal (mm) e seus valores percentuais no período de 1981-2019 no município de Lagoa Seca - PB. Entre os meses de março a agosto os índices pluviométricos representam 77% do valor anual e entre os meses de setembro a fevereiro 23%.




Figura 4 – Distribuição da precipitação mensal (mm) e seus valores percentuais no período de 1981-2019 no município de Lagoa Seca - PB. Fonte: Medeiros (2020).

Nóbrega *et al.* (2015) analisaram a flutuação e tendências de índices de extremos de chuva em Pernambuco por meio de dados relativos ao período de 1978 a 2010. Dantas *et al.* (2015) observaram tendências sazonais e anuais de índices de extremos pluviométricos para a Cidade de Campina Grande, no período 1975 a 2011. Os resultados de tais estudos corroboram para a metodologia da pesquisa.

A Figura 5 representa a precipitação observada e suas tendências de precipitações estimadas pelas médias móveis para 5 e 7 anos para a área em estudo. As estimativas das médias móveis de 7 anos apresentam valores de maiores significâncias do que para os 5 anos. Estudos semelhantes foram realizados por Galvêncio (2000) na precipitação do Rio São Francisco para (algum setor alto e médio do curso do rio).




Figura 5 - Precipitação anual e suas retas de tendência média móvel para 5 e 7 anos no período de 1981-2019 em Lagoa Seca - PB. Fonte: Medeiros (2020).

Medeiros *et al.* (2018) mostraram que no computo das médias móveis para São Bento do Uno (PE) as estimativas das medias-móveis de 10 anos apresentam valores de maiores significâncias. Eventos extremos em muitos casos vêm ocorrendo devido a episódio simultâneo de várias escalas temporais que são responsáveis por anomalias pluviométricas, corroborando com Andreoli *et al.* (2004), Gershunov *et al.* (1998) e Silva (2017).

Conclusões

As irregularidades pluviais entre 2000-2019 registraram dez anos seco; seis anos muito seco; três anos muito chuvoso e um ano a predominância de anos seco e muito seco vem ocasionando impactos aos produtores do hortifrutigranjeiro que vem utilizando-se de maiores tempos em irrigações.

A irregularidade no quantitativo e distribuição temporal das chuvas são fatores limitantes para o desenvolvimento da produção agropecuária e hortifruticultor na área de estudo.

A série temporal constituída dos totais pluviais mensais registrados a cada ano entre 1981-2019, não representa componentes significativas de correlação serial, tendências temporais ou periodicidades.

Referências

AESA. Agencia executiva de água e clima do Estado da Paraíba. 2020.

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**. 22, 711–728. 2014.

ANDRADE, A. J. P.; SILVA, N. M.; SOUZA, C. R. As percepções sobre as variações e mudanças climáticas e as estratégias de adaptação dos agricultores familiares do Seridó potiguar. **Desenvolvimento e Meio Ambiente** 31, 77-96. 2014.

Andreoli, R. V.; Kayano, M. T.; Guedes, R. L.; Oyama, M. D.; Alves, M. A. S. A influência da temperatura da superfície do mar dos Oceanos Pacífico e Atlântico na variabilidade de precipitação em Fortaleza, **Revista Brasileira de Meteorologia**, 19, 337-344. 2004.

CAVALCANTI, I. F. A.; NUNES, L. H.; MARENGO, J. A.; GOMES, J. L.; SILVEIRA, V. P.; CASTELLANO, M. S. Projections of Precipitation Changes in Two Vulnerable Regions of São Paulo State, Brazil. **American Journal of Climate Change**, v. 06, p. 268-293, 2017.

CAVALCANTI, E. P., SILVA, E. D. V. Estimativa da temperatura do ar em função das coordenadas locais. IN: Congresso Brasileiro de Meteorologia. 8. 1994. **Belo Horizonte, Anais... Belo Horizonte: SBMET**, v.1, 154-157pp. 1994.

CAVALCANTI, E. P.; SILVA, V. P. R.; SOUSA, F. A. S. Programa computacional para estimativa da temperatura do ar. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Brasil, v. 10, n. 1, p. 140-147. 2006. Editora@ufcg.edu.br. p.150. 2016.

CHIERICE, R. A. F.; LANDIM, P. M. B. Variabilidade Espaço-Temporal de Precipitação Pluviométrica na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. **Revista de Geociências**, v.33, n.1, p. 157-171, 2014.

DA SILVA, D. F. Aplicação de Análises de Ondaletas para Detecção de Ciclos e Extremos Pluviométricos no Leste do Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Meteorologia**, 32, 187-198. 2017.

DANTAS, L.G.; SANTOS, C.A.C.; OLINDA, R.A. Tendências anuais e sazonais nos extremos de temperatura do ar e precipitação em Campina Grande - PB. **Revista Brasileira**. 2015.

DUARTE, C. C.; NÓBREGA, R. S.; COUTINHO, R. Q. Análise climatológica e dos eventos extremos de chuva no município de Ipojuca, Pernambuco. **Revista de Geografia (UFPE)** 32, 158-176. 2015.

FARIAS, R. F. L.; ALVES, K. M. A. S.; NÓBREGA, R.S. Climatologia da ocorrência de eventos extremos de precipitação na mesorregião do Sertão Pernambucano. **Revista Geonordeste** 1, 930-941. 2012.

GALVÍNCIO, J. D. Impactos dos eventos El Niño na precipitação da Bacia do rio São Francisco. **Dissertação de Mestrado em Meteorologia**, Campina Grande. Universidade Federal da Paraíba (PB), p.117, 2000.

GERSHUNOV A, BARNETT, T. P. Interdecadal modulation of ENSO teleconnections. **Bulletin of the American Meteorological Society**, 79: 2715–2725. 1998.

GHINI, R.; HAMADA, E.; BETTIOL, W. Climate change and plant diseases. **Scientia Agricola** 65, 98-107. 2008.

GROPPO, J. D.; MORAES, J. M.; BEDUSCHI, C.E.; GENOVEZ, A.M.; MARTINELLI, L.A. Trend analysis of water quality in some rivers with different degrees of development within the São Paulo State, Brazil. **Rivers Research and Applications** 1, 1-2. 2008.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pachauri, R.K., Meyer, L.A. (eds.). IPCC, Switzerland. 2014.

ISHIHARA JÚNIOR, H.; FERNANDES, L. L.; DUARTE, A. A.; ALMEIDA, M.; DUARTE, A. R. C. I. M.; PONTE, M, X. L.; Glauber E. Quantitative and Spatial Assessment of Precipitation in the Brazilian Amazon (Legal Amazon) - (1978 to 2007). **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v.19, n. 1, p. 29 – 39, 2014.

KARMESHU, N. Trend Detection in Annual Temperature & Precipitation using the Mann Kendall Test - A Case Study to Assess Climate Change on Select States in the northeastern United States. Master's thesis. University of Pennsylvania. **Filadélfia, Penn.** 2012.

KÖPPEN, W.; GEIGER, R. **Klimate der Erde**. Gotha: Verlag Justus Perthes, 1928.

KÖPPEN, W. **Grundriss der Klimakunde**: Outline of climate science. Berlin: Walter de Gruyter, 388p. 1931.

LACERDA, F.F., NOBRE, P., SOBRAL, M.C. LOPES, G.M.B. Alterações climáticas globais: uma realidade em Pernambuco, in: **Academia Pernambucana de Ciência Agrônômica**, Recife. 2015.

LAI, C.; CHEN, X.; WANG, Z.; WU, X.; ZHAO, S.; WU, X.; BAI, W. Spatio-temporal variation in rainfall erosivity during 1960–2012 in the Pearl River Basin, China. **Catena**, v. 137, p. 382-391, 2016.

MARENGO, J.A.; ALVES, L.M.; BESERRA, E.A.; LACERDA, F.F. Variabilidade e mudanças climáticas no semiárido brasileiro. Recursos hídricos em regiões áridas e semiáridas. ISBN 978-85-64265-01-1. INSA. Pag. 303 – 422. Campina Grande-PB. 2011.

MARENGO, J. A.; CAMARGO, C. C. Surface air temperature trends in Southern Brazil for 1960 - 2002. **International Journal of Climatology**. v.28, p.893-904. 2008.

MEDEIROS, R. M.; HOLANDA, R. M.; VILAR, H. N. Climate Change in Tacaimbó-PE, Brazil. *Journal of Hyperspectral Remote Sensing* 8, 60-66. 2018.

MEDEIROS, R. M.; HOLANDA, R. M.; SILVA, V. P. Tendências pluviiais e análise da média móvel para São Bento do Una - PE, Brasil. **Revista de Geografia (Recife)**. V. 35, No. 5, 2018.

MEDEIROS, M. C.; LUZ, E. L. P.; MEDEIROS, R. M.; KOZMHINSKY, M. Variabilidade espacial e temporal da precipitação no município de Serra Talhada - PE, Brasil. 2017. **I Congresso Internacional da diversidade no semiárido**. Diversidade aprendendo o semiárido no semiárido e com o semiárido. Campina Grande – PB. www.conidis.com.br. 2016.

MEDEIROS, R. M.; SILVA, V. M. A.; MELO, V.S.; MENEZES, H.E.A. Diagnosis and trend rainfall in Bom Jesus - Piauí, Brazil. **Revista verde** 11, 115-121. 2016.

MEDEIROS, R. M.; BORGES, C. K.; VIEIRA, L. J. S. Precipitation climatological analysis in the municipality of Bananeiras - PB, in the period 1930-2011 as contribution to Agroindustry. **Green Paper on Agroecology and Sustainable Development** 2, 10. 2012.

MOURA, D. M. S. Panorama geral sobre a expansão urbana e a influência nas mudanças climáticas: do âmbito mundial ao nordeste brasileiro, in: Araújo A.R., Belchior G.P.N., Viegas, T.E.S. Os impactos das mudanças climáticas no Nordeste brasileiro. Fundação Sintaf, Fortaleza, **Instituto o Direito por um Planeta Verde**, São Paulo, pp. 35-56. 2016.

NOBREGA, R. S.; FARIAS, R. F. L.; SANTOS, C. A. C. Variabilidade Temporal e Espacial da Precipitação Pluviométrica em Pernambuco através de Índices de Extremos Climáticos. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v.30, n.2, p. 171 - 180, 2015.

NÓBREGA, J.N.; SANTOS, C.A.C.; GOMES, O.M.; BEZERRA, B.G.; BRITO, J.I.B. Eventos Extremos de Precipitação nas Mesorregiões da Paraíba e suas Relações com a TSM dos Oceanos Tropicais. **Revista Brasileira de Meteorologia** 29, 197 - 208. 2014.

NUNES, C.R.P. As mudanças climáticas a partir da implantação de empresas de capital estrangeiro no Nordeste: Estado regulador?, in: Araújo, A.R., Belchior, G.P.N., Viegas, T.E.S. (orgs). Os impactos das mudanças climáticas no Nordeste brasileiro. Fundação Sintaf, Fortaleza, **Instituto O Direito por um Planeta Verde**, São Paulo. 2016

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde. Desastres Naturais e Saúde no Brasil. OPAS, Ministério da Saúde, Brasília, DF. (**Série Desenvolvimento Sustentável e Saúde, 2**). 2014.

PBMC. Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2014. **Sumário Executivo do GT2**. PBMC, Rio de Janeiro, Brasil.

PENEREIRO, J. C.; ORLANDO, D. V. Análise de tendências em séries temporais anuais de dados climáticos e hidrológicos na bacia do rio Parnaíba entre os Estados do Maranhão e Piauí/Brasil. **Revista Geográfica Acadêmica** 7, 5-21. 2013.

PINKAYAN, S. **Conditional Probabilities of Occurrence of Wet and Dry Years ver a Large Continental Area**. Hydrology Papers, n. 12, Colorado State University, Boulder-Co, 1966.

PRIORI, J. R. L. Mudanças Climáticas e possíveis impactos nas cidades costeiras do Nordeste brasileiro. Disponível: http://research.fit.edu/sealevelriselibrary/documents/doc_mgr/479/Priori%20Jr.%202013.%20Possiveis%20impactos%20no%20nordeste%20brasileiro%20%28portug%29.pdf. 2014.

SANTOS, C. A. C. Estimativa e tendências de índices de detecção de mudanças climáticas com base na precipitação diária no Rio Grande do Norte e na Paraíba. **Dissertação (Mestrado)**. Campina Grande, UFCG. 2006.

SANTOS NETO, L. A. Variabilidade da precipitação horária em Porto Velho – RO e suas tendências anuais e sazonais. **Dissertação (Mestrado)** – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, UNIR, Porto Velho, Rondônia. 71f. 2014.

THORNTHWAITE, C. W. An Approach Toward a Rational Classification of Climate. Geogr. Ver. 38, 55-94. 1948.

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The Water Balance. New Jersey: Drexel Institute Of Technology. **Publications In Climatology**, 104p. 1955.

YANG, T.; SHAO, Q.; HAO, Z. C.; CHEN, X.; ZHANG, Z.; XU, C. Y.; SUN, L. Regional frequency analysis and spatio-temporal pattern characterization of rainfall extremes in the Pearl River Basin, China. **Journal of Hydrology**, v.380, p. 386-405, 2010.

ZHIJIA, G.; XINGWU, D.; BING, L.; JINMING, H.; JIAONAN, H. The spatial distribution and temporal variation of rainfall erosivity in the Yunnan Plateau, Southwest China: 1960–2012. *Catena*, v. 145, p. 291-300, 2016.

WANDERLEY, L. S. A.; NÓBREGA, R. S.; MOREIRA, A. B.; ANJOS, R. S.; ALMEIDA, C.A.P. As chuvas na cidade de Recife: uma climatologia de extremos. **Revista Brasileira de Climatologia** 14, 149-164. 2018.

151

WMO. World Meteorological Organization. Disponível:
https://www.wmo.int/pages/index_en.html. 2019.

XAVIER, T. M. B. S.; XAVIER, A. F. S. Classificação e Monitoração de Períodos Secos e Chuvosos e Cálculo de Índices Pluviométricos para a Região Nordeste do Brasil, **Revista Brasileira de Engenharia. Cadernos de Recursos Hídricos**, Volume 5, nº 2, pp.7-31, 1987.

XAVIER, T. M. B. S.; SILVA, J. F.; REBELLO, E. R. G. A. **Técnica dos quantis e suas aplicações em Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, com ênfase para as regiões brasileiras**. Thesaurus Editora de Brasília Ltda. Brasília, 2002.141p.